





美奇幼兒園衛教宣導單



0



腸病毒 不可不知的小知識

孩童開學腸病毒疫情風險略有升溫。疾管局呼籲預防腸病毒的基本方法仍是勤洗 手、戴口罩,以及避免與感染者接觸。

傳染涂徑:

腸病毒的傳染性極強,主要經由腸胃道(糞-口、水或食物污染)或呼吸道(飛沫、 咳嗽或打噴嚏) 傳染,也可經由接觸病童皮膚上的水泡及分泌物而傳染。

在發病前數天,喉嚨部位與糞便就可發現病毒,此時即有傳染力,通常以發病後 一週內傳染力最強。

症狀:





手部皮疹





足部皮疹





臀部皮疹





: 課票三載初

- 1、正確手部衛生:用餐前、如廁後務必洗手,避免共用餐具與毛巾。
- 2、留意症狀:發燒合併喉嚨痛、潰瘍或持續流口水,應及早就醫。
- 3、生病不上學:孩子若疑似感染,請務必儘速就醫,並在家休息,落實「生病不 上學」原則。

消毒方法: 使用稀釋後漂白水(最方便經濟有效)





特殊環境消毒:

使用1000ppm濃度的漂白水 消毒病人分泌物或排泄物



天然紫外線及加熱煮沸

- 戶外紫外線及加熱煮沸均能有效殺滅腸病毒; 衣物可使用沸水浸泡或曝曬等方式
- 紫外線殺菌燈(如無設備可使用稀釋後漂白水替代)

使用漂白水消毒時,穿戴好防水手套、口罩及圍裙,並保持好環境通風 静待10分鐘後再以清水擦拭一遍,消毒完成!